DuoTEMP

dual cure temporary filling material

Gebrauchsinformation — DE

Definition
DuoTEMP ist ein dual härtendes, röntgenopakes, weisses Füllungsmaterial zur provisorischen Füllung von Zahnkavitäten. DuoTEMP basiert auf Zinkoxid- / Zinksulfat-zement und ist für Kurzzeitprovisorien (Einsatz von max. 30 Tagen) konzipiert.

Zusammensetzung
Zinkoxid
Füllstoffe
Methacrylatharz
Natriumfluorid

Anwendungsgebiete
- Provisorische Füllungen von Kavitäten der Klassen I und II
- Provisorischer Verschluss in der Endodontie
- Provisorische Versorgung von Inlay- und Onlay-Präparationen

Gegenanzeigen
Provisorische Füllung, bei welcher die Kavitätenpräparation mehrflächig ist und bis an bzw. unter die Gingiva (subgingival) reicht.

Sicherheitshinweise
⚠ WARNUNG
- Abgabe nur an Zahnärzte oder Zahntechniker oder in deren Auftrag.
- Bei Allergien gegen Bestandteile von DuoTEMP, siehe Notfallmaßnahmen.

⚠ VORSICHT
- DuoTEMP sollte nicht länger als 1 Monat im Mund verbleiben.
- Aufgrund der leichten Expansion von DuoTEMP ist bei sehr tiefen Kavitäten mit dünnen Schmelzrändern Vorsicht geboten, da es zu Frakturen kommen kann.
- DuoTEMP härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten mit vitalen Zähnen kann durch Wasserentzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von DuoTEMP mit Wasserspray angefeuchtet werden.
- Angebrochene Spritzen weisen eine reduzierte Haltbarkeit auf, siehe Haltbarkeit und Lagerung

Markierung
Das Verfallsdatum und die Chargen-Bezeichnung LOT sind auf den Behältnissen ersichtlich.

Herausgabe dieser Gebrauchsinformation
01-2019

Instructions for use — EN

Definition
DuoTEMP is a dual-cured, radiopaque, white-colored filling material for temporary filling of dental cavities. DuoTEMP is a zinc oxide / zinc sulphate-based cement and is designed for short term temporary applications (designed to be used for max. 30 days).

Composition
Zinc oxide
Fillers
Methacrylate resin
Natrium fluoride

Indications
- Temporary fillings of class I and II cavities
- Temporary sealing in endodontics
- Temporary filling for inlay and onlay preparations

Contra-indications
Temporary filling of cavities, in which the cavity preparation has multiple surfaces and extends up to or under the gingiva (subgingival).

Safety information
⚠ WARNING
- Only supplied to dentists and dental laboratories or upon their instructions.
- Established allergy to one of the components of DuoTEMP, see emergency measures.

⚠ CAUTION
- DuoTEMP should not remain in the oral cavity for more than one month.
- Due to the slight expansion of DuoTEMP, care must be taken in very deep cavities with thin enamel margins, as fractures may result.
- DuoTEMP cures by absorbing water. Dehydration in the cavity of vital teeth can cause short term pain. The cavity should therefore be kept moist using a water spray before applying DuoTEMP.
- Opened syringes have a reduced shelf life, see shelf life and storage

NOTE
- DuoTEMP bonds to other methacrylate-based products, e.g. with light cured cavity liner materials. Therefore, the cavity liner material should be isolated using a glycerine gel to prevent it from being removed during removal. Interactions with other agents are unknown.
- DuoTEMP is photosensitive, and should not be exposed to light too long, in particular to the operating light or sunlight.

Application of DuoTEMP for temporary fillings and temporary endodontic sealing
⚠ Moisten the cleaned cavity using water spray. Pick up pre-dosed DuoTEMP from the pad using a spatula or an instrument, apply and wipe it into the cavity. Condense DuoTEMP into the cavity using a condenser, and gently condense it to the cavity walls. It is recommended not to fill very deep cavities up to the base of the cavity to ensure that DuoTEMP can be easily removed from the cavity.
Optional
For easier removal of the temporary filling, glycerine gel can be applied before the application of DuoTEMP in the cavity. Thus, the adhesion can be reduced.

Application of DuoTEMP for temporary fillings with an inlay or onlay preparation
Apply glycerine gel into the moistened cavity. Glycerine provides better moistening between the tooth and DuoTEMP, and simplifies the removal from the temporary filling. The adhesion is also with glycerine ensured. Pick up predosed DuoTEMP from the pad using a spatula or an instrument, apply and wipe it into the cavity. Condense DuoTEMP into the cavity using a condenser, and gently condense it into the cavity walls.

Removal of excess material
Excess material should be removed before curing using a spatula or proper instrumentation.

Curing
DuoTEMP cures by water sorption (e.g. saliva action) within 2 h. The temporary filling can be immediately subjected to mastication pressure, if the surface is cured using all common curing light units (e.g. Coltolux LED). Recommended curing time: 40 s (light output ≥800mW/cm²).
If possible, protect the pre-dosed DuoTEMP material on the pad using a non light-transmitting covering (not blue colored).

Handling
Remove occlusal contact points using a scaler.
The surface of the light-cured temporary filling surface can be carefully finished using proper rotary instrumentation.

Removal of DuoTEMP temporary fillings and endodontic sealing from the cavity
DuoTEMP can be easily removed from the cavity in large pieces using a drill or a scaler. Rinse off any residue from the cavity using a water spray.

⚠ Emergency measures
In the case of direct contact with the oral mucosa, rinsing with tap water is sufficient. In the case of contact with the eyes, rinse thoroughly with water (10 min), and consult an ophthalmologist showing these instructions for use.

Shelf life and storage
⚠ DuoTEMP is susceptible to moisture.
The syringe bodies, furnished with a protective covering, are vacuum packed and sealed in barrier bags (tropic-proof). Opened syringes have a reduced shelf life and should be used up quickly.
DuoTEMP and the syringe body must be stored dry, tightly sealed at temperatures from 15 °C / 59 °F to 23 °C / 73 °F. Avoid exposure to direct sunlight or other heat sources.

Marking
The expiration date and LOT number are marked on the containers.

Caution
Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Date of issue
01-2019

Mode d'emploi — FR

Présentation
DuoTEMP est un matériau radio-opaque blanc à présentation double, composé d'une poudre et d'un flacon provisoire des cavités dentaires. DuoTEMP est un ciment à base d'oxyde de zinc et de sulfate de zinc développé pour les applications provisoires de courte durée, maximum 30 jours.

Composition
Oxyde de zinc
Charges
Résine méthacrylique
Fluorure de sodium

Indications
- Obturation provisoire des cavités de classes I et II
- Scellement endodontique provisoire
- Obturation provisoire dans le cadre des préparations pour inlays et onlays

Contre-indications
Obturation provisoire des cavités dont la préparation présente plusieurs surfaces et s'étend jusqu'à ou sous la gencive (préparation sous-gingivale).

Données de sécurité
⚠ AVERTISSEMENT
- Ces produits sont exclusivement vendus à des dentistes et à des laboratoires dentaires ou sur leur prescription.
- En cas d'allergie vérifiée à l'un des ingrédients de DuoTEMP, voir les mesures d'urgence.

⚠ ATTENTION
- DuoTEMP ne doit pas rester dans la cavité orale plus d'un mois.
- En raison de la légère expansion de DuoTEMP, la prudence est impérative dans les cavités très profondes aux bords amélaires fins à cause du risque de fracture.
- DuoTEMP durcit en absorbant l'eau. La déshydratation survenant dans la cavité des dents vitales peut occasionner une douleur à court terme. La cavité doit par conséquent être maintenue humide avec un jet d'eau avant l'application de DuoTEMP.
- Les seringues ouvertes ont une durée de vie plus courte - voir Durée de vie et conservation

REMARQUE
- DuoTEMP se lie aux produits à base de méthacrylate, comme par exemple les fonds de cavité photopolymérisables. Il convient par conséquent d'isoler le fond de cavité avec un gel à base de glycérine pour empêcher qu'il ne soit éliminé lors du retrait de DuoTEMP. Les interactions avec d'autres agents ne sont pas connues.
- DuoTEMP étant photosensible, il ne doit pas être exposé à la lumière trop longtemps, notamment à la lumière de la lampe d'opération ou du soleil.

Application de DuoTEMP pour l'obturation et le scellement endodontique provisoire
⚠ Humidifier la cavité nettoyée avec un jet d'eau. Prélever le matériau DuoTEMP prédosé sur le bloc avec une spatule ou un autre instrument et l'appliquer dans la cavité avant DuoTEMP. Avec un condenseur, tasser DuoTEMP et le faire adhérer contre les parois. Il est recommandé de ne pas remplir les cavités très profondes jusqu'au fond pour garantir un retrait aisé de DuoTEMP.
Facultatif
Pour faciliter le retrait de l'obturation provisoire, il est possible d'appliquer un gel à base de glycérine avant l'insertion de DuoTEMP dans la cavité. Il est ainsi possible de limiter l'adhérence.

Application de DuoTEMP pour l'obturation provisoire avec une préparation pour inlay ou onlay
Appliquer le gel à base de glycérine dans la cavité humidifiée. La glycérine assure une meilleure humidification entre la dent et DuoTEMP et simplifie le retrait de l'obturation provisoire. L'adhérence est également assurée avec la glycérine. Prélever le matériau DuoTEMP prédosé sur le bloc avec une spatule ou un autre instrument et l'appliquer dans la cavité. Insérer DuoTEMP dans la cavité avec un fouloir, puis le tasser délicatement contre les parois.

Élimination des excès de matériau
Il convient d'éliminer les excès de matériau avant la polymérisation avec une spatule ou un instrument adapté.

Polymérisation
DuoTEMP durcit par absorption d'eau (p. ex. action de la salive) en 2 h. L'obturation provisoire peut immédiatement subir la pression masticatoire lorsque sa surface est polymérisée avec une lampe à polymériser courante (p. ex. Coltolux LED). Temps de polymérisation recommandé : 40 s (intensité lumineuse ≥ 800 mW/cm²).
Si possible, protéger le matériau DuoTEMP prédosé sur le bloc avec un couvercle opaque (pas de couleur bleue).

Manipulation
Éliminer les points de contact occlusal avec un instrument à détartrer.
La surface de l'obturation provisoire photopolymérisée peut être soigneusement finie avec des instruments rotatifs adaptés.

Retrait des obturations et scellements endodontiques provisoires de la cavité
DuoTEMP peut aisément être retiré de la cavité par gros morceaux avec un fouret ou un instrument à détartrer. Éliminer les résidus éventuels de la cavité avec un jet d'eau. Les résidus tenaces peuvent être aisément éliminés avec une brosserie.

Retrait de DuoTEMP des préparations pour inlays et onlays
DuoTEMP peut aisément être retiré de la cavité par gros morceaux avec un instrument à détartrer.
Éliminer les résidus éventuels de la cavité avec un jet d'eau.

⚠ Mesures d'urgence
En cas de contact direct avec la muqueuse buccale, un rinçage à l'eau du robinet est suffisant. En cas de contact avec les yeux, les rincer abondamment à l'eau (pendant 10 min), puis consulter un ophtalmologue en lui montrant ce mode d'emploi.

Durée de vie et conservation
⚠ DuoTEMP est sensible à l'humidité.
Les seringues, fournies avec un capuchon de protection, sont emballées sous vide dans des sachets étanches scellés (résistants au climat tropical). Les seringues ouvertes ont une durée de vie plus courte et doivent être utilisées rapidement.
DuoTEMP en seringue entamée doit impérativement être conservé au sec, dans un emballage hermétique et à une température comprise entre 15 et 23 °C. Éviter l'exposition à la lumière directe du soleil ou à toute autre source de chaleur.

Marquage
La date limite d'utilisation et le numéro de LOT figurent sur les récipients.

Date de rédaction ou de révision de la notice
01-2019

Istruzioni per l'uso — IT

Definizione
DuoTEMP è un materiale d'otturazione bianco a polimerizzazione duale, radiopaco, per otturazioni provvisorie di cavità dentali. DuoTEMP è a base di cemento all'ossido di zinco / solfato di zinco ed è studiata per applicazioni temporanee di breve durata (non oltre 30 giorni).

Composizione
Ossido di zinco
Materiali riempitivi
Resina metacrilica
Fluoruro di sodio

Indicazioni
- Otturazioni provvisorie di cavità delle classi I e II
- Chiusura provvisoria nella regione endodontica
- Restauro provvisorio di preparazioni inlay e onlay

Controindicazioni
Otturazioni provvisorie di cavità nelle quali la preparazione della cavità presenta più superfici e si estende fino alla gengiva o al di sotto della stessa (subgengivale).

Informazioni di sicurezza
⚠ AVVERTENZE
- Fornitura riservata unicamente a dentisti, laboratori odontotecnici o a persone da loro incaricate.
- Allergia nota verso uno dei componenti di DuoTEMP, vedere le misure d'emergenza.

⚠ ATTENZIONE
- DuoTEMP non deve rimanere nel cavo orale per più di un mese.
- Prestare attenzione in presenza di cavità molto profonde con margini dello smalto sottili, poiché potrebbero verificarsi fratture per effetto della leggera espansione di DuoTEMP.
- DuoTEMP indurisce assorbendo acqua. In cavità non devitalizzate, la sottrazione di acqua può causare dolori di breve durata. Si consiglia pertanto di inumidire la cavità interessata con spray ad acqua prima di applicare DuoTEMP.
- Le siringhe aperte presentano durata ridotta, vedere Durata e conservazione

NOTA
- DuoTEMP si lega ad altri prodotti a base di metacrilato, ad es. rivestimenti fotopolimerizzabili per rivestimenti di cavità. Si raccomanda pertanto di isolare il rivestimento del fondo con gel di glicerina, affinché questo non venga asportato durante la rimozione del materiale. Non sono note interazioni con altre sostanze.
- DuoTEMP è fotosensibile, quindi non dovrebbe troppo a lungo alla luce, soprattutto a quella emessa dalla lampada chirurgica o alla luce solare.

Applicazione di DuoTEMP per otturazioni provvisorie e chiusure provvisorie nella regione endodontica
⚠ Inumidire la cavità pulita con lo spray ad acqua. Prelevare DuoTEMP predosato dal supporto con una spatola o uno strumento adeguato, quindi applicarlo nella cavità. Spingere DuoTEMP nella cavità con un pestello e adattarlo delicatamente alle pareti della cavità. Si consiglia di non riempire fino in fondo le cavità molto profonde per consentire una più facile rimozione di DuoTEMP dalla cavità stessa.
In alternativa
Per agevolare la rimozione dell'otturazione provvisoria, è possibile applicare gel di glicerina nella cavità prima di inserire DuoTEMP. In questo modo l'adesività del materiale può risultare ridotta.

Applicazione di DuoTEMP per restauri provvisori di preparazione inlay o onlay
Applicare il gel di glicerina nella cavità inumidita. La glicerina migliora l'interfaccia umida fra il dente e DuoTEMP e agevola la successiva rimozione dell'otturazione provvisoria. L'adesività è garantita anche con il gel di glicerina. Prelevare DuoTEMP predosato dal supporto con una spatola o uno strumento adeguato, quindi applicarlo nella cavità. Spingere DuoTEMP nella cavità con un pestello e adattarlo delicatamente alle pareti della cavità.

Asportazione del materiale in eccesso
Il materiale in eccesso deve essere asportato con una spatola o uno strumento adeguato prima che indurisca.

Indurimento
Assorbendo acqua (ad es. per effetto della saliva) DuoTEMP indurisce nel giro di 2 ore. Affinché l'otturazione possa resistere immediatamente alla pressione masticatoria, è possibile indurire la superficie con l'ausilio di qualsiasi normale lampada di polimerizzazione (ad es. Coltolux LED). Tempo di indurimento raccomandato: 40 s (intensità luminosa ≥800 mW/cm²).
Proteggere eventualmente il materiale DuoTEMP predosato sul supporto con uno schermo opaco (non di colore blu).

Lavorazione
Asportare i punti occlusali con uno scaler.
La superficie dell'otturazione provvisoria fotopolimerizzata può essere lavorata con un adeguato strumento rotante osservando la dovuta cautela.

Rimozione di DuoTEMP dalla cavità nel caso di otturazioni provvisorie e chiusure provvisorie nella regione endodontica
DuoTEMP può essere facilmente rimosso dalla cavità a grandi pezzi utilizzando una fresa o uno scaler. Eliminare tutti i residui dalla cavità risciacquando con spray ad acqua.

⚠ Misure di emergenza
In caso di contatto diretto del prodotto con la mucosa orale, sciacquare semplicemente con acqua di rubinetto. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua (per 10 minuti) e consultare un oculista, mostrandogli queste istruzioni per l'uso.

Durata e conservazione
⚠ DuoTEMP è sensibile all'umidità.
I corpi delle siringhe provvisti di tappo protettivo sono confezionati sotto vuoto e sigillati in sacchetti a prova di umidità (tropic proof). Le siringhe aperte presentano una durata ridotta e devono essere utilizzate rapidamente.
DuoTEMP contenuto in siringhe già utilizzate va conservato ermeticamente chiuso in luogo asciutto a temperature comprese tra 15 °C / 59 °F e 23 °C / 73 °F. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore.

Marcatura
La data di scadenza e il numero di lotto LOT sono indicati sulle confezioni.

Data di emissione
01-2019

Instrucciones de uso — ES

Definición
DuoTEMP es un material de obturación provisional de color blanco, polimerizable con dual y radio-opaco. DuoTEMP se compone de un cemento de óxido de cinc / de sulfato de cinc y ha sido concebido para obturaciones provisionales de corta duración (máximo de 30 días).

Composición
Óxido de zinc
Particulas de relleno
Resina de metacrilato
Fluoruro de sodio

Campos de aplicación
- Obturaciones provisionales en cavidades de las clases I y II
- Cierre provisional en la endodoncia
- Rehabilitación provisional de preparaciones de inlays y onlays

Contraindicaciones
En las restauraciones provisionales con una preparación de cavidad de varios planos que llega hasta la cenia o debajo de ella (subgingival).

Información de seguridad
⚠ ADVERTENCIA
- Para suministro exclusivo a dentistas y laboratorios dentales o bajo su autorización.
- Consultar las medidas de emergencia en caso de alergia conocida a uno de los componentes de DuoTEMP.

⚠ ATENCIÓN
- DuoTEMP no debe permanecer en la boca más de un mes.
- En el caso de cavidades muy profundas es posible que, debido a la ligera expansión de DuoTEMP, se produzca la fractura de los bordes excesivamente finos del esmalte.
- DuoTEMP polimeriza por la absorción de agua. En cavidades de dientes vitales pueden llegar a producirse breves momentos de dolor por deshidratación de la pieza. Por eso razón, antes de aplicar el DuoTEMP se tiene que humedecer la cavidad con un aerosol de agua.
- Consultar la vida útil y el almacenamiento de las jeringas, porque su periodo de validez se reduce una vez abiertas

NOTA
- DuoTEMP se asocia con otros productos compuestos por metacrilato, p.ej., con materiales de rebase fotopolimerizables. Por eso, para que el rebase no salga con la extracción de la obturación es necesario aislarlo con gel de glicerina para evitar su eliminación durante la extracción. No se conocen interacciones con otros agentes.
- DuoTEMP es sensible a la luz por eso no debería ser expuesto a una iluminación prolongada, en especial a la luz de la lámpara de operaciones y a la luz del sol.

Aplicación de DuoTEMP para las obturaciones provisionales y cierres temporales de endodoncias
⚠ Humedecer la cavidad limpia con el aerosol de agua. Recoger el DuoTEMP previamente dosificado con una espátula u otro instrumento adecuado, aplicarlo a la cavidad y extenderlo. Introducir el DuoTEMP con un obturador en la cavidad y adaptar el producto a las paredes de la misma presionándolo ligeramente. Se recomienda no rellenar las cavidades profundas hasta el fondo para que después se pueda extraer con facilidad el DuoTEMP de la cavidad.
Opcional
Para retirar de forma más sencilla la obturación provisional puede aplicarse gel de glicerina en la cavidad antes de la aplicación de DuoTEMP. Así se puede reducir la adhesión.

Aplicación de DuoTEMP para obturaciones provisionales en preparaciones de inlays y onlays
Aplicar el gel de glicerina en la cavidad humedecida. La glicerina permite una mejor humectación entre el diente y DuoTEMP y simplifica la posterior retirada de la obturación provisional. La adhesión también queda garantizada con el gel de glicerina. Recoger el DuoTEMP previamente dosificado con una espátula u otro instrumento adecuado, aplicarlo a la cavidad y extenderlo. Introducir el DuoTEMP en la cavidad y adaptar el producto a las paredes de la misma presionándolo ligeramente.

Retirada del exceso de material
El exceso de material debe retirarse con una espátula u otro instrumento adecuado antes de la polimerización.

Polimerización
DuoTEMP polimeriza mediante la absorción de agua (p.ej. el efecto de la saliva) en 2 h. Para que la obturación pueda exponerse inmediatamente a la presión oclusal, la superficie se puede polimerizar con la luz azul de una lámpara de polimerización (p.ej. Coltolux LED). Tiempos de polimerización recomendados: 40 s (potencia luminosa ≥800m W/cm2).
En caso necesario proteger la dosificación de DuoTEMP dispuesta en el bloque de mezclas con una cubierta que no permita el paso de la luz (no debe ser de color azul).

Procesado
Eliminar los puntos de contacto con un escarificador.
La superficie de la obturación provisional fotopolimerizada puede trabajarse con cuidado empleando un instrumento rotatorio adecuado.

Extracción de DuoTEMP de la cavidad en la obturación provisional y en el cierre temporal de endodoncias
DuoTEMP puede extraerse fácilmente de la cavidad en trozos grandes con una fresa o un escarificador. A continuación deberá enjuagarse la cavidad con el aerosol de agua para eliminar los restos. Los posibles restos pueden retirarse fácilmente con un cepillo.

Extracción de DuoTEMP de preparaciones de inlays y onlays
DuoTEMP puede extraerse fácilmente de la cavidad en trozos grandes con un escarificador.
A continuación deberá enjuagarse la cavidad con el aerosol de agua para eliminar los restos.

⚠ Medidas en caso de emergencia
En caso de contacto directo con la mucosa bucal bastará con enjuagarse la boca con agua corriente. En caso de contacto con los ojos lavarlos bien con agua (10 min) y consultar a un oculista. Mostrarle estas instrucciones de uso.

Caducidad y conservación
⚠ DuoTEMP es sensible a la humedad.
Los cuerpos de jeringa, provistos de una envoltura protectora, están envasados al vacío dentro de bolsas barrera selladas (tropic-proof). Las jeringas abiertas tienen una vida útil reducida, por eso se deben utilizar en un periodo breve de tiempo.
DuoTEMP contenido en jeringas abiertas debe guardarse seco, cerrado de forma hermética y a una temperatura de 15 °C / 59 °F a 23 °C / 73 °F. No exponga el producto a la luz solar directa o a otras fuentes de calor.

Marcado
La fecha de caducidad y el número de LOT aparece marcado en los recipientes.

Fecha de publicación
01-2019

Instruções de utilização — PT

Definição
O DuoTEMP é um material para obturação provisória das cavidades dentárias de polimerização dupla, radio-opaco e branco. O DuoTEMP é um cimento à base de óxido de zinco/sulfato de zinco e foi concebido para aplicações de curta duração (destinado a ser usado mão. de 30 dias).

Composição
Óxido de zinco
Cargas
Resina de metacrilato
Fluoreto de sódio

Indicações
- Obturações provisórias de cavidades tipo I e II
- Selagem provisória em endodôncia
- Selagem provisória para preparações de inlays e onlays

Contraindicações
Obturação provisória de cavidades em que a preparação da cavidade tem múltiplas superfícies e se estende até à gengiva ou abaixo desta (subgengival).

Informações de segurança
⚠ AVISO
- Fornecido apenas a dentistas e laboratórios dentários ou de acordo com as instruções destes.
- Caso se constate haver alergia declarada a algum dos componentes de DuoTEMP, ver medidas de emergência.

⚠ CUIDADO
- O DuoTEMP não deve permanecer na cavidade oral por mais de um mês.
- Devido à ligeira dilatação de DuoTEMP, deve ter-se atenção às cavidades muito profundas com margens de esmalte finas, que podem resultar em fratura.
- O DuoTEMP endurece com a absorção de água. A desidratação das cavidades dos dentes vitais pode provocar uma curta dor. A cavidade deve, assim, ser humedecida com um spray aquoso antes de se aplicar o DuoTEMP.
- As seringas abertas têm uma vida útil reduzida, ver prazo de validade e armazenamento

NOTA
- O DuoTEMP liga-se a outros produtos à base de metacrilato, p. ex., com materiais de revestimento de cavidades fotopolimerizáveis. Deste modo, o material de revestimento de cavidades deve ser isolado com um gel de glicerina para evitar que seja retirado durante a remoção. Não se conhecem interações com outras substâncias.
- O DuoTEMP é fotossensível e não deverá ser exposto demasiado tempo à luz, especialmente à luz de operação ou luz solar.

Aplicação de DuoTEMP para obturações provisórias e selagem endodôntica provisória
⚠ Humedeça a cavidade limpa com um spray aquoso. Retire o DuoTEMP dosea-do previamente do bloco com uma espátula ou um instrumento, aplique e esfregue-o na cavidade. Condense o DuoTEMP na cavidade com um condensador, e condense-o suavemente nas paredes da cavidade. Aconselha-se a não encher as cavidades muito profundas até a base, para garantir que o DuoTEMP possa ser removido facilmente da cavidade.
Opcional
Para uma mais fácil remoção da obturação provisória, pode aplicar-se gel de glicerina antes da aplicação de DuoTEMP na cavidade. Desta forma, a adesão pode ser reduzida.

Aplicação de DuoTEMP para obturações provisórias com preparação de inlays ou onlays
Aplique gel de glicerina na cavidade humedecida. A glicerina proporciona um melhor humedecimento entre o dente e o DuoTEMP e simplifica a remoção da obturação provisória. A adesão está também garantida com glicerina. Retire o DuoTEMP dosead-o previamente do bloco com uma espátula ou um instrumento, aplique e esfregue-o na cavidade. Condense o DuoTEMP na cavidade com um condensador e condense-o suavemente nas paredes da cavidade.

Remoção do material excedentário
O material excedentário deve ser removido antes da polimerização com uma espátula ou instrumentos adequados.

Polimerização
O DuoTEMP polimeriza com a absorção de água (p. ex., ação da saliva) após 2 h. A cura pela ativação da luz pode ser realizada com qualquer unidade de fotopolimerização comum (p. ex., Coltolux LED). Tempos de polimerização recomendados: 40 s (débito de luz ≥800 mW/cm²).
Se possível, proteja o material DuoTEMP previamente doseado no bloco com uma cobertura que não transmita luz (não de cor azul).

Manuseamento
Elimine os pontos de contacto oclusais com um rospador.
A superfície da obturação provisória fotopolimerizada pode ser acabada cuidadosamente com instrumentos rotativos adequados.

Remoção das obturações provisórias de DuoTEMP e selagem endodôntica da cavidade
O DuoTEMP pode ser removido facilmente da cavidade em pedaços grandes com uma broca ou raspador. Limpe da cavidade qualquer resíduo com um spray aquoso. Os resíduos restantes podem ser removidos facilmente com uma escova.

Remoção de DuoTEMP de preparados de inlays e onlays
O DuoTEMP pode ser removido facilmente da cavidade em pedaços grandes com um raspador.
Limpe da cavidade qualquer resíduo com um spray aquoso.

⚠ Medidas de emergência
Em caso de contacto direto com a mucosa oral, basta enxaguar com água corrente. Em caso de contacto com os olhos, lave abundantemente com água (10 min) e consulte um oftalmologista, mostrando-lhe estas instruções de utilização.

Durabilidade e armazenamento
⚠ DuoTEMP é sucetível à humidade.
Os corpos das seringas, fornecidos com uma capa de proteção são embalados a vácuo e selados em sacos de plástico revestidos a alumínio (tropic-proof). As seringas abertas têm uma vida útil reduzida e devem ser usadas rapidamente.
DuoTEMP em seringas pré-usadas deve ser armazenado seco, bem selado a temperaturas entre os 15 °C/59 °F e os 23 °C/73 °F. Evite a exposição à luz solar

to profundas com margens de esmalte finas, que podem resultar em fratura.
- O DuoTEMP endurece com a absorção de água. A desidratação das cavidades dos dentes vitais pode provocar uma curta dor. A cavidade deve, assim, ser humedecida com um spray aquoso antes de se aplicar o DuoTEMP.
- As seringas abertas têm uma vida útil reduzida, ver prazo de validade e armazenamento

NOTA
- O DuoTEMP liga-se a outros produtos à base de metacrilato, p. ex., com materiais de revestimento de cavidades fotopolimerizáveis. Deste modo, o material de revestimento de cavidades deve ser isolado com um gel de glicerina para evitar que seja retirado durante a remoção. Não se conhecem interações com outras substâncias.
- O DuoTEMP é fotossensível e não deverá ser exposto demasiado tempo à luz, especialmente à luz de operação ou luz solar.

Aplicação de DuoTEMP para obturações provisórias e selagem endodôntica provisória
⚠ Humedeça a cavidade limpa com um spray aquoso. Retire o DuoTEMP dosea-do previamente do bloco com uma espátula ou um instrumento, aplique e esfregue-o na cavidade. Condense o DuoTEMP na cavidade com um condensador, e condense-o suavemente nas paredes da cavidade. Aconselha-se a não encher as cavidades muito profundas até a base, para garantir que o DuoTEMP possa ser removido facilmente da cavidade.
Opcional
Para uma mais fácil remoção da obturação provisória, pode aplicar-se gel de glicerina antes da aplicação de DuoTEMP na cavidade. Desta forma, a adesão pode ser reduzida.

Aplicação de DuoTEMP para obturações provisórias com preparação de inlays ou onlays
Aplique gel de glicerina na cavidade humedecida. A glicerina proporciona um melhor humedecimento entre o dente e o DuoTEMP e simplifica a remoção da obturação provisória. A adesão está também garantida com glicerina. Retire o DuoTEMP dosead-o previamente do bloco com uma espátula ou um instrumento, aplique e esfregue-o na cavidade. Condense o DuoTEMP na cavidade com um condensador e condense-o suavemente nas paredes da cavidade.

Remoção do material excedentário
O material excedentário deve ser removido antes da polimerização com uma espátula ou instrumentos adequados.

Polimerização
DuoTEMP polimeriza mediante la absorción de agua (p.ej. el efecto de la saliva) en 2 h. Para que la obturación pueda exponerse inmediatamente a la presión oclusal, la superficie se puede polimerizar con la luz azul de una lámpara de polimerización (p.ej. Coltolux LED). Tiempos de polimerización recomendados: 40 s (potencia luminosa ≥800m W/cm2).
En caso necesario proteger la dosificación de DuoTEMP dispuesta en el bloque de mezclas con una cubierta que no permita el paso de la luz (no debe ser de color azul).

Procesado
Eliminar los puntos de contacto con un escarificador.
La superficie de la obturación provisional fotopolimerizada puede trabajarse con cuidado empleando un instrumento rotatorio adecuado.

Extracción de DuoTEMP de la cavidad en la obturación provisional y en el cierre temporal de endodoncias
DuoTEMP puede extraerse fácilmente de la cavidad en trozos grandes con una fresa o un escarificador. A continuación deberá enjuagarse la cavidad con el aerosol de agua para eliminar los restos. Los posibles restos pueden retirarse fácilmente con un cepillo.

Extracción de DuoTEMP de preparaciones de inlays y onlays
DuoTEMP puede extraerse fácilmente de la cavidad en trozos grandes con un escarificador.
A continuación deberá enjuagarse la cavidad con el aerosol de agua para eliminar los restos.

⚠ Medidas en caso de emergencia
En caso de contacto directo con la mucosa bucal bastará con enjuagarse la boca con agua corriente. En caso de contacto con los ojos lavarlos bien con agua (10 min) y consultar a un oculista. Mostrarle estas instrucciones de uso.

Caducidad y conservación
⚠ DuoTEMP es sensible a la humedad.
Los cuerpos de jeringa, provistos de una envoltura protectora, están envasados al vacío dentro de bolsas barrera selladas (tropic-proof). Las jeringas abiertas tienen una vida útil reducida, por eso se deben utilizar en un periodo breve de tiempo.
DuoTEMP contenido en jeringas abiertas debe guardarse seco, cerrado de forma hermética y a una temperatura de 15 °C / 59 °F a 23 °C / 73 °F. No exponga el producto a la luz solar directa o a otras fuentes de calor.

Marcado
La fecha de caducidad y el número de LOT aparece marcado en los recipientes.

Fecha de publicación
01-2019

Gebruiksaanwijzing — NL

Definitie
DuoTEMP is een duaal uithardend, radiopaak, wit vulmateriaal voor het tijdelijk vullen van caviteiten in gebitselementen. DuoTEMP is een cement op zinkoxide- / zinksulfaatbasis en is bestemd voor kortdurende, tijdelijke vullingen (in principe max. 30 dagen te gebruiken).

Samenstelling
Zinkoxide
Vulstoffen
Methacrylaathars
Natriumfluoride

Indicaties
- Tijdelijk vullen van caviteiten in klasse I en II
- Tijdelijke endodontische afsluiting
- Tijdelijke voorziening voor inlay- en onlaypreparaties

Contra-indicaties
Tijdelijk vullen bij een geprepareerde caviteit met meerdere vlakken die tot aan oppervlakkig gingivaal reikt (subgingivaal gaat).

Veiligheidsinformatie
⚠ WAARSCHUWING
- Wordt alleen geleverd aan of op instructie van tandartsen en tandtechnische laboratoria.
- Bekende allergie voor een van de bestanddelen van DuoTEMP, zie noodmaatregelen.

⚠ VOORZICHTIG
- DuoTEMP mag niet langer dan 1 maand in de mond blijven zitten.
- Bij zeer diepe caviteiten kunnen zeer dunne glazuurranden leiden tot breuk, vanwege de lichte expansie van DuoTEMP.
- DuoTEMP polimeriseert door la absorción de agua. En cavidades de dientes vitales pueden llegar a producirse breves momentos de dolor por deshidratación de la pieza. Por eso razón, antes de aplicar el DuoTEMP se tiene que humedecer la cavidad con un aerosol de agua.
- Gespende spuiten hebben een verminderde houdbaarheid, zie houdbaarheid en bewaren

OPMERKING
- DuoTEMP gaat een verbinding aan met andere op methacrylaat gebaseerde producten, bijv. lichtuithardende onderlaagmaterialen. De onderlaag moet daarom met glycerinegel worden geïsoleerd, zodat het niet bij het verwijderen wordt meegevoerd. Wisselwerkingen met andere middelen zijn niet bekend.
- DuoTEMP is lichtgevoelig en mag niet te lang worden blootgesteld aan licht, met name aan operatielicht of zonlicht.

Aanbrengen van DuoTEMP bij tijdelijke vullingen en tijdelijke endodontische afsluiting
⚠ Bevochtig de gereinigde caviteit met een waterspray. Haal de vooraf gedoseerde DuoTEMP uit het depot of ander geschikt instrument van het mengblok, breng deze aan in de caviteit en strijk af. Stop DuoTEMP met een stopper in de caviteit en condenser het zachtjes voorzichtig tegen de cavitetwanden. Het is raadzaam zeer diepe caviteiten niet tot aan de bodem van de caviteit te vullen, zodat DuoTEMP gemakkelijk uit de caviteit kan worden verwijderd.
Optie
Om het verwijderen van de tijdelijke vulling te vergemakkelijken, kan glycerinegel vóór het aanbrengen van DuoTEMP in de caviteit worden aangebracht. Hiermee kan de hechting gereduceerd worden.

Aanbrengen van DuoTEMP bij de tijdelijke voorzieningen voor inlay- en onlaypreparaties
Breng glycerinegel aan in de licht bevochtigde caviteit. Glycerine leidt tot een betere bevochtiging tussen gebitselement en DuoTEMP en vereenvoudigt de latere verwijdering van de tijdelijke vulling. Ook met de glycerinegel is een goede hechting gegarandeerd. Haal de vooraf gedoseerde DuoTEMP met een spatel of ander geschikt instrument van het mengblok, breng deze aan in de caviteit en strijk het af. Stop DuoTEMP met een stopper in de caviteit en condenseer het daarna voorzichtig tegen de cavitetwanden.

Verwijderen van overtollig materiaal
Het overtollige materiaal moet vóór uitharding met een spatel of ander geschikt instrument worden verwijderd.

Uitharding
DuoTEMP hardt binnen 2 uur uit door wateropname (bijv. inwerking van speeksel). Om ervoor te zorgen dat de vulling direct met kauwdruk kan worden belast, kan het oppervlak met blauw licht van een polymerisatielamp (bijv. Coltolux LED) worden uitgehard. Aanbevolen uithardingsduur: 40 sec. (lichtsterkpunt ≥ 800 mW/cm²).
Scherm vooraf op het mengblok gedoseerde porties DuoTEMP eventueel af met een afdekking die geen licht doorlaat (niet blauwgekleurd).

Bewerking
Verwijder de occlusale contactpunten met een scaler.
De met licht uitgeharde tijdelijke vulling kan aan het oppervlak voorzichtig met een passend roterend instrument worden bewerkt.

Verwijderen van DuoTEMP uit de caviteit bij tijdelijke vullingen en bij tijdelijke endodontische afsluiting
DuoTEMP kan met een boor of scaler moeiteloos in grotere stukken weer uit de caviteit worden verwijderd. Spoel eventuele resten uit de caviteit met een waterspray. Eventueel achtergebleven resten kunnen met een borstel gemakkelijk worden verwijderd.

Verwijderen van DuoTEMP uit de caviteit bij een tijdelijke voorziening voor inlay- en onlaypreparaties
DuoTEMP kan met een scaler moeiteloos in grotere stukken weer uit de caviteit worden verwijderd.
Spoel eventuele resten uit de caviteit met een waterspray.

⚠ Noodmaatregelen

DuoTEMP

dual cure temporary filling material

- DuoTEMP используется для временного лечения зубов. Обладает высокой прочностью и эластичностью, что позволяет использовать его для лечения больших полостей, а также для временной фиксации коронок и мостовидных протезов.
- Материал DuoTEMP имеет двойной механизм отверждения: химический и световой. Это обеспечивает надежную полимеризацию даже в труднодоступных участках, куда свет не проникает.
- Материал DuoTEMP обладает низкой усадкой при полимеризации, что снижает риск краевой микропротечки и вторичного кариеса.
- Материал DuoTEMP имеет приятный цвет, который не изменяется со временем, что важно для эстетики временной реставрации.
- Материал DuoTEMP легко удаляется с помощью стандартных инструментов, не повреждая твердые ткани зуба.
- Материал DuoTEMP обладает хорошей адгезией к эмали и дентину, что обеспечивает надежную фиксацию временной конструкции.
- Материал DuoTEMP устойчив к воздействию слюны и пищевых кислот, что предотвращает его преждевременное разрушение.
- Материал DuoTEMP имеет удобную консистенцию, которая легко замешивается и наносится на полость зуба.
- Материал DuoTEMP совместим с большинством стоматологических материалов, что позволяет использовать его в комбинации с другими препаратами.
- Материал DuoTEMP имеет срок годности, указанный на упаковке, который необходимо соблюдать для сохранения его свойств.

Применение

Материал DuoTEMP используется для временного пломбирования полостей зубов, временной фиксации коронок и мостовидных протезов, а также для временного покрытия культи зуба при подготовке к протезированию.

Противопоказания

Не использовать материал DuoTEMP при аллергии на компоненты материала, при недостаточной толщине твердых тканей зуба (менее 0,5 мм), при наличии открытых пульпитов или некротизированной пульпы, а также при глубоком кариесе, когда есть риск перфорации.

Способ применения

Перед применением материала DuoTEMP необходимо тщательно очистить полость зуба от кариозных тканей и остатков старого пломбировочного материала. Высушить полость, но не пересушивать, чтобы не повредить дентин. Нанести адгезивный праймер, если он входит в комплект, и равномерно распределить его по стенкам полости. Замешать материал DuoTEMP в соотношении, указанном производителем, до получения однородной массы. Внести материал в полость зуба, плотно прижать и сформировать окклюзионную поверхность. Дождаться полного отверждения материала, используя световую лампу, если это предусмотрено инструкцией.

Меры предосторожности

Избегать попадания материала DuoTEMP на слизистые оболочки и кожу, так как он может вызвать раздражение. При работе с материалом использовать перчатки и защитные очки. Не использовать материал DuoTEMP по истечении срока годности, указанного на упаковке. Хранить материал DuoTEMP в плотно закрытой упаковке, в сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Срок годности и условия хранения

Материал DuoTEMP имеет срок годности 2 года при соблюдении условий хранения. Хранить материал DuoTEMP в оригинальной упаковке, плотно закрытой, при температуре от +5 °C до +25 °C, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Не замораживать материал DuoTEMP. Не использовать материал DuoTEMP после истечения срока годности, указанного на упаковке, так как это может привести к снижению его качества и увеличению риска осложнений.

Упаковка

Материал DuoTEMP выпускается в виде двухкомпонентной системы, включающей базовую пасту и катализатор, упакованные в тубы по 15 г каждая. В комплект также входят смешивающая спираль, шприц для нанесения материала и инструкция по применению. Возможна поставка материала DuoTEMP в виде набора для одного пациента, включающего все необходимые компоненты и инструменты.

Производитель

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

CE 0123

Glossary

- Consult instructions for use
- Keep away from sun light
- Temperature limitation
- Relative humidity
- Notified body registration number
- Identification for Russia
- Identification for Ukraine
- Legal manufacturer
- Expiry date

Strīvējuma

Cement DuoTEMP se strdí s sorpcijo vode (npr. delovanjem sline) v dveh urah. Začasna plomba lahko takoj prenese pritisk zaradi žvečenja, če se površina strdi s pomočjo obličajoih svetlobnih luči za strjevanje (npr. Coltolux® LED). Priporočeni čas strjevanja je 40 s (izhodna svetloba ≥ 800 mW/cm2). Če je le mogoče, vnajmanj odmerjeno količino materiala DuoTEMP na površino čista zaščitite z zaščito, ki ne prepušča svetlobe (in ni modre barve).

Ravnanje

Okluzijske kontaktne točke odstranite s pripomočkom za čiščenje. Površino začasne plombe, ki se je svetlobno strdila, lahko previdno obdelate s primernim vrtečim se instrumentom (svedrom).

Odstranjevanje začasnih plomb iz začasne koronarne zapore v endodontiji DuoTEMP iz kavitete

Cement DuoTEMP lahko v večjih delih zlahka odstranite iz kavitete s pomočjo svedra ali pripomočka za čiščenje. Z ovalnim prišlom iz kavitete izperite vse ostanke. Preostanek lahko zlahka odstranite s krtačko.

Odstranjevanje cementa DuoTEMP iz preparacij za inleje in onleje

Cement DuoTEMP lahko v večjih delih zlahka odstranite iz kavitete s pomočjo pripomočka za čiščenje.
Zatem prišlom iz kavitete izperite vse ostanke.

⚠ Ukrepi v nujnem primeru

Ob neposrednem stiku z ustno sluznico zadošča izpiranje z vodo iz pipe. Ob stiku z očmi temeljito izpirajte z vodo (10 min), nato pa se posvetujte z oftalmologom in nu pokažite to navodilo za uporabo.

Rok uporabe in shranjevanje

⚠ Cement DuoTEMP je obložljiv na vlago.
Ohlije brige, zaščiteno z zaščitno prevleko, je vakuumsko zapakirano in zapečatano v vrečki. V predstavlja pregrado (zaščito pred vlago). Odprte brizge imajo krajši rok uporabe in jih je treba hitro porabiti.
Cement DuoTEMP v že opisanih brizgah morate shranjevati dobro zaprtega in suhem mestu pri sobni temperaturi (od najmanj 15 °C do 23 °C. Izogibajte se izpostavljenosti neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote.

Oznake
Datum izteka roka uporabe in številka LOT sta označena na vsebnikih.

Datum izdaje
01-2019

Naudojimo instrukcijos — LT

Apibrėžimas

„DuoTEMP" yra dvejopo kietėjimo, rentgenokontrastinis, baltos spalvos medžiaga, skirta dantų ertmėms laikinai užplėdyti. „DuoTEMP" yra cinko oksido / cinko sulfato cementas, skirtas naudoti tradicinėmis užpildžiamis sudėtimis (sukurtas naudoti dauguiausia 30 dienų).

Sudėtis

Cinko oksidas
Užpildai
Metakrilato derva
Natrio fluoridas

Indikacijos

- Laikinas I ir II klasių ertmių užplėdymas
- Laikinas endodontinis sandarinimas
- Laikinas užplėdymas ruošiant įklotus ar užklotus

Kontraindikacijos

Laikinas ertmių, kurias ruošiant naudojami keli paviršiai ir kurios tęsiasi iki dantiena arba po juo, plombavimas.

Saugos informacija

⚠ DĖMESIO

- Tiekiama tik odontologams ir odontologijos laboratorijoms arba jų nurodymu.
- Nustatyta alergijos vienai iš „DuoTEMP" sudedamųjų dalių, žr. priemones nenumatytas atvejais.

⚠ DĖMESIO

- „DuoTEMP" negalima palikti danties ertmėje ilgiau nei vieną mėnesį.
- „DuoTEMP" liek tiek išsiplečia, todėl plombuojant labai gilias ertmes su pulpos ir dentino kontaktu gali atsirasti jautrumas, nes dantis gali sužeisti.
- „DuoTEMP" kietėja sugeriamą vandenį. Dehidratacija gyvų dantų ertmėje gali sukelti trumpalaikį skausmą. Todėl prieš naudojant „DuoTEMP" ertmę reikia sudrėkinti vandens purkštikliu.
- Atidarytų įvirtikių galiojimo laikas yra trumpesnis, žr. galiojimo laiką ir laikymą

Strjevanje

Cement DuoTEMP se strdi s sorpcijo vode (npr. delovanjem sline) v dveh urah. Začasna plomba lahko takoj prenese pritisk zaradi žvečenja, če se površina strdi s pomočjo obličajoih svetlobnih luči za strjevanje (npr. Coltolux® LED). Priporočeni čas strjevanja je 40 s (izhodna svetloba ≥ 800 mW/cm2). Če je le mogoče, vnajmanj odmerjeno količino materiala DuoTEMP na površino čista zaščitite z zaščito, ki ne prepušča svetlobe (in ni modre barve).

Ravnanje

Okluzijske kontaktne točke odstranite s pripomočkom za čiščenje.
Površino začasne plombe, ki se je svetlobno strdila, lahko previdno obdelate s primernim vrtečim se instrumentom (svedrom).

Odstranjevanje začasnih plomb iz začasne koronarne zapore v endodontiji DuoTEMP iz kavitete

Cement DuoTEMP lahko v večjih delih zlahka odstranite iz kavitete s pomočjo svedra ali pripomočka za čiščenje. Z ovalnim prišlom iz kavitete izperite vse ostanke. Preostanek lahko zlahka odstranite s krtačko.

Odstranjevanje cementa DuoTEMP iz preparacij za inleje in onleje

Cement DuoTEMP lahko v večjih delih zlahka odstranite iz kavitete s pomočjo pripomočka za čiščenje.
Zatem prišlom iz kavitete izperite vse ostanke.

⚠ Ukrepi v nujnem primeru

Ob neposrednem stiku z ustno sluznico zadošča izpiranje z vodo iz pipe. Ob stiku z očmi temeljito izpirajte z vodo (10 min), nato pa se posvetujte z oftalmologom in nu pokažite to navodilo za uporabo.

Rok uporabe in shranjevanje

⚠ Cement DuoTEMP je obložljiv na vlago.
Ohlije brige, zaščiteno z zaščito prevleko, je vakuumsko zapakirano in zapečatano v vrečki. V predstavlja pregrado (zaščito pred vlago). Odprte brizge imajo krajši rok uporabe in jih je treba hitro porabiti.
Cement DuoTEMP v že opisanih brizgah morate shranjevati dobro zaprtega in suhem mestu pri sobni temperaturi (od najmanj 15 °C do 23 °C. Izogibajte se izpostavljenosti neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote.

Oznake
Datum izteka roka uporabe in številka LOT sta označena na vsebnikih.

Datum izdaje
01-2019

Naudojimo instrukcijos — LT

Apibrėžimas

„DuoTEMP" yra dvejopo kietėjimo, rentgenokontrastinis, baltos spalvos medžiaga, skirta dantų ertmėms laikinai užplėdyti. „DuoTEMP" yra cinko oksido / cinko sulfato cementas, skirtas naudoti tradicinėmis užpildžiamis sudėtimis (sukurtas naudoti dauguiausia 30 dienų).

Sudėtis

Cinko oksidas
Užpildai
Metakrilato derva
Natrio fluoridas

Indikacijos

- Laikinas I ir II klasių ertmių užplėdymas
- Laikinas endodontinis sandarinimas
- Laikinas užplėdymas ruošiant įklotus ar užklotus

Kontraindikacijos

Laikinas ertmių, kurias ruošiant naudojami keli paviršiai ir kurios tęsiasi iki dantiena arba po juo, plombavimas.

Saugos informacija

⚠ DĖMESIO

- Tiekiama tik odontologams ir odontologijos laboratorijoms arba jų nurodymu.
- Nustatyta alergijos vienai iš „DuoTEMP" sudedamųjų dalių, žr. priemones nenumatytas atvejais.

⚠ DĖMESIO

- „DuoTEMP" negalima palikti danties ertmėje ilgiau nei vieną mėnesį.
- „DuoTEMP" liek tiek išsiplečia, todėl plombuojant labai gilias ertmes su pulpos ir dentino kontaktu gali atsirasti jautrumas, nes dantis gali sužeisti.
- „DuoTEMP" kietėja sugeriamą vandenį. Dehidratacija gyvų dantų ertmėje gali sukelti trumpalaikį skausmą. Todėl prieš naudojant „DuoTEMP" ertmę reikia sudrėkinti vandens purkštikliu.
- Atidarytų įvirtikių galiojimo laikas yra trumpesnis, žr. galiojimo laiką ir laikymą

Strjevanje

Cement DuoTEMP se strdí s sorpcijo vode (npr. delovanjem sline) v dveh urah. Začasna plomba lahko takoj prenese pritisk zaradi žvečenja, če se površina strdi s pomočjo obličajoih svetlobnih luči za strjevanje (npr. Coltolux® LED). Priporočeni čas strjevanja je 40 s (izhodna svetloba ≥ 800 mW/cm2). Če je le mogoče, vnajmanj odmerjeno količino materiala DuoTEMP na površino čista zaščitite z zaščito, ki ne prepušča svetlobe (in ni modre barve).

Ravnanje

Okluzijske kontaktne točke odstranite s pripomočkom za čiščenje.
Površino začasne plombe, ki se je svetlobno strdila, lahko previdno obdelate s primernim vrtečim se instrumentom (svedrom).

Odstranjevanje začasnih plomb iz začasne koronarne zapore v endodontiji DuoTEMP iz kavitete

Cement DuoTEMP lahko v večjih delih zlahka odstranite iz kavitete s pomočjo svedra ali pripomočka za čiščenje. Z ovalnim prišlom iz kavitete izperite vse ostanke. Preostanek lahko zlahka odstranite s krtačko.

Odstranjevanje cementa DuoTEMP iz preparacij za inleje in onleje

Cement DuoTEMP lahko v večjih delih zlahka odstranite iz kavitete s pomočjo pripomočka za čiščenje.
Zatem prišlom iz kavitete izperite vse ostanke.

⚠ Ukrepi v nujnem primeru

Ob neposrednem stiku z ustno sluznico zadošča izpiranje z vodo iz pipe. Ob stiku z očmi temeljito izpirajte z vodo (10 min), nato pa se posvetujte z oftalmologom in nu pokažite to navodilo za uporabo.

Rok uporabe in shranjevanje

⚠ Cement DuoTEMP je obložljiv na vlago.
Ohlije brige, zaščiteno z zaščito prevleko, je vakuumsko zapakirano in zapečatano v vrečki. V predstavlja pregrado (zaščito pred vlago). Odprte brizge imajo krajši rok uporabe in jih je treba hitro porabiti.
Cement DuoTEMP v že opisanih brizgah morate shranjevati dobro zaprtega in suhem mestu pri sobni temperaturi (od najmanj 15 °C do 23 °C. Izogibajte se izpostavljenosti neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote.

Oznake
Datum izteka roka uporabe in številka LOT sta označena na vsebnikih.

Datum izdaje
01-2019

Naudojimo instrukcijos — LT

Apibrėžimas

„DuoTEMP" yra dvejopo kietėjimo, rentgenokontrastinis, baltos spalvos medžiaga, skirta dantų ertmėms laikinai užplėdyti. „DuoTEMP" yra cinko oksido / cinko sulfato cementas, skirtas naudoti tradicinėmis užpildžiamis sudėtimis (sukurtas naudoti dauguiausia 30 dienų).

Sudėtis

Cinko oksidas
Užpildai
Metakrilato derva
Natrio fluoridas

Indikacijos

- Laikinas I ir II klasių ertmių užplėdymas
- Laikinas endodontinis sandarinimas
- Laikinas užplėdymas ruošiant įklotus ar užklotus

Kontraindikacijos

Laikinas ertmių, kurias ruošiant naudojami keli paviršiai ir kurios tęsiasi iki dantiena arba po juo, plombavimas.

Saugos informacija

⚠ DĖMESIO

- Tiekiama tik odontologams ir odontologijos laboratorijoms arba jų nurodymu.
- Nustatyta alergijos vienai iš „DuoTEMP" sudedamųjų dalių, žr. priemones nenumatytas atvejais.

⚠ DĖMESIO

- „DuoTEMP" negalima palikti danties ertmėje ilgiau nei vieną mėnesį.
- „DuoTEMP" liek tiek išsiplečia, todėl plombuojant labai gilias ertmes su pulpos ir dentino kontaktu gali atsirasti jautrumas, nes dantis gali sužeisti.
- „DuoTEMP" kietėja sugeriamą vandenį. Dehidratacija gyvų dantų ertmėje gali sukelti trumpalaikį skausmą. Todėl prieš naudojant „DuoTEMP" ertmę reikia sudrėkinti vandens purkštikliu.
- Atidarytų įvirtikių galiojimo laikas yra trumpesnis, žr. galiojimo laiką ir laikymą

Strjevanje

Cement DuoTEMP se strdí s sorpcijo vode (npr. delovanjem sline) v dveh urah. Začasna plomba lahko takoj prenese pritisk zaradi žvečenja, če se površina strdi s pomočjo obličajoih svetlobnih luči za strjevanje (npr. Coltolux® LED). Priporočeni čas strjevanja je 40 s (izhodna svetloba ≥ 800 mW/cm2). Če je le mogoče, vnajmanj odmerjeno količino materiala DuoTEMP na površino čista zaščitite z zaščito, ki ne prepušča svetlobe (in ni modre barve).

Ravnanje

Okluzijske kontaktne točke odstranite s pripomočkom za čiščenje.
Površino začasne plombe, ki se je svetlobno strdila, lahko previdno obdelate s primernim vrtečim se instrumentom (svedrom).

Odstranjevanje začasnih plomb iz začasne koronarne zapore v endodontiji DuoTEMP iz kavitete

Cement DuoTEMP lahko v večjih delih zlahka odstranite iz kavitete s pomočjo svedra ali pripomočka za čiščenje. Z ovalnim prišlom iz kavitete izperite vse ostanke. Preostanek lahko zlahka odstranite s krtačko.

Odstranjevanje cementa DuoTEMP iz preparacij za inleje in onleje

Cement DuoTEMP lahko v večjih delih zlahka odstranite iz kavitete s pomočjo pripomočka za čiščenje.
Zatem prišlom iz kavitete izperite vse ostanke.

⚠ Ukrepi v nujnem primeru

Ob neposrednem stiku z ustno sluznico zadošča izpiranje z vodo iz pipe. Ob stiku z očmi temeljito izpirajte z vodo (10 min), nato pa se posvetujte z oftalmologom in nu pokažite to navodilo za uporabo.

Rok uporabe in shranjevanje

⚠ Cement DuoTEMP je obložljiv na vlago.
Ohlije brige, zaščiteno z zaščito prevleko, je vakuumsko zapakirano in zapečatano v vrečki. V predstavlja pregrado (zaščito pred vlago). Odprte brizge imajo krajši rok uporabe in jih je treba hitro porabiti.
Cement DuoTEMP v že opisanih brizgah morate shranjevati dobro zaprtega in suhem mestu pri sobni temperaturi (od najmanj 15 °C do 23 °C. Izogibajte se izpostavljenosti neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote.

Oznake
Datum izteka roka uporabe in številka LOT sta označena na vsebnikih.

Datum izdaje
01-2019

Kasutusjuhend — ET

Määratlus

„DuoTEMP" on topeltkõvastuv röntgenkontrastne valge täidis hambaaukude ajutiseks täitmiseks. „DuoTEMP on tsinkoksiidi/sulfaatsõnadel põhinev täidis, mis on mõeldud lühiajaliseks ajutiseks kasutamiseks (maks. 30 päeva).

Koostis

Tsinkoksiid
Täidised
Metakrülaatvaik
Naatriumfluoriid

Näidustused

- I ja II klassi aukude ajutised täidised
- Ajutine sulgemine endodontias
- Ajutine täidis sissepaigutuste ja pealmise kihi valmistamisel

Vastunäidustused

Selliste aukude ajutine täitmine, mille puhul ettevalmistatud augul on mitu pinda ja see ulatub igemeni või igeme alla (igemealune).

Ohutusteave

⚠ HOIATUS

- Kasutamiseks ainult hambaravis ja laborites või nende juhtnoodile schoxet.
- Tuvastatud allergia mõne DuoTEMPi komponendi vastu, vt erakorralised meetmed.

⚠ ETTEVAATUST

- DuoTEMP ei tohi jääda suuõonde kauemaks kui üheks kuuks.
- Kuna DuoTEMP paisub veidi, tuleb olla väga sõgavate õhukeste emailiseaadete ja aukude puhul ettevaatlik, kuna servad võivad murduda.
- DuoTEMP kõvastub ee imamise kaudu. Elus hammaste õõnsuses tekkiv dehüdratsioon võib põhjustada lühiajalist valu. Seetõttu tuleb auku niiskena hoida ja kuivatada enne DuoTEMPi paigaldamist ogenditsi.
- Avatud süstelaod on lühem säilivusaeg, vaata säilivusaeg ja säilitamine

⚠ HOIATUS

- DuoTEMP ühendub teiste metakrülaadipõhiste toodetega, nt valgusõvastuvate augusoodestusmaterjalidega. Seetõttu tuleb augusoodestusmaterjal koleerida glütserliingeeliga, et vältida selle eemaldamist täidise eemaldamise käigus. Koostisoodumust muude ainetega on teadmata.
- DuoTEMP on fotundlik ega tohi jääda liiga kaua valgusse (eriti töövalgusse või pääkesevalgusse) kätte.

DuoTEMPi kasutamise ajutise täidisena ja ajutiseks endodontilliseks sulgemiseks

⚠ Nõustage puhastatud auku veepritsiga. Võtke eeldoseeritud DuoTEMP spaatli või instrumendiga plaadilt, pange see paika ja kohe auku. Kondenseerige DuoTEMPi koondosaatori abil auku ja kondenseerige see ettevaikaalt auju seintele. Vajaga sügavaid auke ei soovitata põhjani täita, et DuoTEMPi saaks august hõlpsasti eemaldada.

Valikuline

Ajutise täidise hõlpsamaks eemaldamiseks võib enne DuoTEMPi auku paigutamist kanda sinna glütserliingeeli. Sel viisil saab kinnitumist vähendada.

DuoTEMPi kasutamine ajutise täidisena sise- või pealiskihi valmistamisel

Kandke niisutatud auku glütserliingeeli. Glütserin tagab hamba ja DuoTEMPi vahel parema niisutuse ja lihtsustab ajutise täidise eemaldamist. Ka glütseriini kasutades on kinnitumine tagatud. Võtke eeldoseeritud DuoTEMP spaatli või instrumendiga plaadilt, pange see paika ja kondenseerige see ettevaikaalt auju seintele. Kondensaatori abil auku ja kondenseerige see ettevaalikult auju seintele.

Liigse materjali eemaldamine

Liigne material tuleb enne kõvastumist spaatli või sobiva instrumendiga eemaldada.

Kõvastumine

DuoTEMP kõvastub vee imamise kaudu (nt sülje toimel) 2 h jooksul. Kui pind on kõvastunud mõne levinud valgustusseadmega (nt COLTOLUX® LED), võib ajutiste täidiste kohe hammustamise survet rakendada. Soovitusik kõvastumisaeg: 40 s (valguse väljund ≥ 800 mW/cm²). Võimalise korral kaitse eeldoseeritud DuoTEMPi materjal pliaidil valgust tõkestava (mitte sinise) kattega kinni.

Käsitsemine

üregoõl.
Õõlitsen ki az üregből minden maradványt vízpermettel.

⚠ Teendők vészhelyzet esetén
Ha az anyag a szájnyálkahártyával közvetlenül érintkezik, elegendő az egyszeri csapvízes öblítés. A szemmel való érintkezés esetén alaposan öblítse ki vízzel (10 percig), majd forduljon szemészorvoshoz, és mutassa meg ezt a használati utasítást.

Volitelővé

Pred aplikáciou pripravku DuoTEMP do kavity sa môže použiť glycerínový gél, aby sa dočasná výplň dala potom ľahšie odstrániť. Takto sa dá znížiť adhézia.

Aplikácia pripravku DuoTEMP na dočasné výplne z priamych inlejí či onlejí

Do zvlhčenej kavity nanese glycerínový gél. Glycerín zabezpečí lepšie zvlhčenie medzi zubom a materiálom DuoTEMP a uľahčí vybratie dočasnej výplne. Adhézia je zaistená aj glycerínom. Vopred dávkovaný pripravok DuoTEMP naberte z podložky špachtľou alebo nástrojom, aplikujte a vtlačte ho do kavity. DuoTEMP naťačte do kavity pomocou natláčacieho nástroja a zľahka ho nahustite na steny kavity. Veľkých kavít by sa nemalo vypĺňať až na základňu kavity, aby sa zaistilo, že materiál DuoTEMP sa bude dať z kavity ľahko vybrať.

Odstránenie materiálu DuoTEMP z priamych inlejí či onlejí

Materiál DuoTEMP by sa mal odstrániť z kavity ve veľkých kusoch pomocí vrtáčik nebo škrabky. Veľké zbytky vypláchněte z kavity vodní sprchou. Ostatní zbytky lze snadno odstranit kartáčkou.

Odstránenie materiálu DuoTEMP z prípravy inlejí či onlejí

Materiál DuoTEMP by sa mal odstrániť z kavity ve veľkých kusoch nástrojom. Veľké zbytky vypláchnite z kavity vodným sprchou.

Ošetrenie v prípade núdze

⚠ Pri priamom styku s ústnou sliznicou postačí vypláchnutie pitnou vodou. V prípade zásahu očí treba dôkladne vypláchnite vodou (10 min) a poraďte sa s oftalmológom, príčom mu ukážte tento návod na použitie.

Životnosť a skladovanie

⚠ DuoTEMP je citlivý na vlhkosť.
Telá striekačiek vybavené ochranným krytom sú vákuovo balené a zatavené v bariérových vrecúšach (tropikalizovaných). Otvorené striekačky majú obmedzenú životnosť a majú sa rýchlo použiť.
DuoTEMP v použitých injekčných striekačkách sa musí uchovávať suchý, dobre uzatvorený pri teplotách od 15 °C do 23 °C. Zabráňte vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu či inným zdrojom tepla.

Označenie
Dátum exspirácie a číslo LOT sú vyznačené na nádobkách.

Dátum vydania
01-2019

Инструкция за употреба — BG

Дефиниция

DuoTEMP представлява двойно полимеризиращ, рентгеноконтрастен, бял възстановителен материал за временното запълване на зъбни кавитети. DuoTEMP представлява цимент на основата на цинков оксид/цинков сулфат (за употреба в период до максимум 30 дни).

Състав

Цинков оксид
Пълнители
Метакрилатна смола
Натриев флуорид

Показания

- Временно запълване на кавитети от клас I и II
- Временно ендодонтско запечатване
- Временно запълване на кавитети, подготвени за инлеи или онлеи

Противопоказания

Временно запълване на многостенни кавитети, чиито граници достигат гингивата или преминават под нея (субгингивално).

Информация относно безопасността

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Доставя се само на стоматолози и дентални лаборатории или съгласно спазвайки обявите. А съемният чаб еритемозен елемен алапозан обилие ki vizet (10 percig), majd forduljon szemészorvoshoz, és mutassa meg ezt a használati utasítást.

Lejárati idő és tárolás

⚠ A DuoTEMP érzékeny a nedvességre.
A védőborítással ellátott fecskendőtestek vákuumcsomagolásban, lezárt (tropusálva) zárótasakokban kerülnek szállításra. A felnyitott fecskendőnek lejárati ideje rövid, ezért gyorsan fel kell használni őket.
A DuoTEMP-et tartalmazó, nyitva hagyott fecskendőkben lévő DuoTEMP anyagot szárazon, szorosan lezárva, 15 °C és 23 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak vagy más hőforrás hatásának.

Jelölés
A lejárati idő és a LOT-szám fel van tüntetve a tartályokon.

A kibocsátás dátuma

01-2019

Návod na použitie — SK

Definícia

DuoTEMP je dvojito vytvrdzovaný výplňový materiál, neprepúšťajúci RTG žiarenie, bielej farby, na dočasné výplne dentálnych kavít. DuoTEMP je cement na báze oxidu zinočnatého/síranu zinočnatého určený na krátkodobé dočasné aplikácie (maximálne 30 dní).

Zloženie:

Oxid zinočnatý
Plnivá
Metakrylátová živica
Fluorid sodný

Indikácie

- Dočasné výplne kavít triedy I a II
- Dočasné pečatenie v endodoncii
- Dočasné výplne na prípravy inlejí a onlejí

Kontraindikácie

Dočasná výplň kavít, kde príprava kavity má viacero povrchov a presahuje až na dásňa alebo pod dásňa (subgingivália).

Bezpečnostné informácie

⚠ UPOZORNENIE

- Dodáva sa pouze zubním lékařům a zubním laboratořím nebo na základě jejich objednávky.
- Zjištěná alergie na některou ze složek materiálu DuoTEMP; viz nouzová opatření.

⚠ UPOZORNENIE

- Materiál DuoTEMP by neměl zůstávat v ústní dutině déle než jeden měsíc.
- Kvůli mírné expanzi materiálu DuoTEMP se musí u velmi hlubokých kavit s tenkými okrajů skloviny postupovat opatrně, protože může dojít k jejich odlomení.
- Materiál DuoTEMP trvdne absorpcí vody. Dehydratace v kavitě vitálních zubů může způsobit krátkodobou bolest. Před nanesením materiálu DuoTEMP je proto nutné kavitu určitou vlhkou vodní sprchou.
- Otevřené stříkačky mají zkrácenou dobu použitelnosti, viz doba použitelnosti a uchovávání

Uchovávání

Materiál DuoTEMP se dodává v jednotlivých stříkačkách, které jsou zabaleny v ochranném sáčku (odolný vůči tropickému podnebí). Otevřené stříkačky mají krátkou dobu použitelnosti a je nutné je rychle spotřebovat.
Materiál DuoTEMP v již použitých stříkačkách musí být uchováván dokonale utěsněný při teplotách od 15 °C do 23 °C. Chraňte před působením přímého slunečního svitu nebo jiných zdrojů tepla.

Značení
Datum použitelnosti a LOT číslo šarže jsou vyznačeny na obalech.

Datum vydání
01-2019

Használati útmutató — HU

Definíció

A DuoTEMP egy fogüregek ideiglenes tömésére szolgáló kétféleképpen kötő, sugárfogó, fehér színű anyag. A DuoTEMP cink-oxid/cink-szulfát alapú, rövid időtartamú (valguse világos ≥ 800 mW/cm²).
Vólmulse korral kattke eeldoseeritud DuoTEMPi materjal plaadil valgust tõkestava (mitte sinise) kattega kinni.

Összetétel

Cink-oxid
Tömőanyagok
Metakrilát gyanta
Nátrium-fluorid

Indikációk

- I. és II. osztályú üregek ideiglenes tömése
- Ideiglenes lezárás endodoncián
- Ideiglenes tömés inlay és onlay preparációkhoz

Ellenjavallatok

Olyan üregek ideiglenes tömése, amelyekben a kavitás-előkészítések összetett felülete van, és kiterjed a gingivára, illetve alá is (szubgingivalisan).

Biztonsági információk

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Csak fogorvosok és fogászati laboratóriumok számára vagy kérésére szállítható.
- Megállapított allergia a DuoTEMP valamelyik komponensével szemben; lásd a Teendők vészhelyzet esetén című részt.

⚠ FIGYELEM

- A DuoTEMP nem maradhat a szájüregben egy hónapnál tovább.
- A DuoTEMP cekély tágulása miatt a vékony zománcfalakkal rendelkező nagyon mély üregekben vigyázni kell, mert törések fordulhatnak elő.
- A DuoTEMP víz abszorpcióját szárítás keményedik. Az élő fog üregében végbemenő dehidratáció rövid ideig fájdalmat okozhat. Emiatt a DuoTEMP alkalmazása előtt az üreget vízpermettel nedvesen kell tartani.
- A felnyitott fecskendők lejárati ideje rövid; lásd a Lejárati idő és tárolás című részt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A DuoTEMP kötődik más metakrilát alapú termékekhez, például fényre polimerizálódó általében használt üregkaparókhoz. Ezért az alábbiéló tömőanyagot izolálni kell a DuoTEMP eltávolításakor, ezzel megakadályozva a kivételét eltávolító kézben. Kölcsönhatás más összetevőkkel nem ismeretes.
- A DuoTEMP fényérzékeny, ezért tilos hosszú ideig fénynek (különösen orvosi lámpa fényének vagy napfénynek) kitenni.

A DuoTEMP alkalmazása ideiglenes tömésekhez és ideiglenes endodontiás lezáráshoz

⚠ Nedvesítse meg vízpermettel a megtisztított üreget. Vegyen fel a tömbről előadagolt DuoTEMP anyagot spatulával vagy egy megfelelő eszközzel, vigye fel és kenje az üregbe. Kondenzorral tömörítse a DuoTEMP anyagot az üregbe, majd óvatosan tömörítse az üreg falára. Javasoljuk, hogy a nagyon mély üregeket ne töltse meg egyetlen adagban, hogy a DuoTEMP-et egyszerűen el lehessen távolítani az üregből.

Opcionális

Az ideiglenes tömés egyszerűbb eltávolítása érdekében a DuoTEMP üregbe való felvitele előtt glicerinzselt alkalmazható, ily módon csökkenthető az adhézió.

A DuoTEMP alkalmazása ideiglenes tömésekhez inlay vagy onlay preparációval

Vigyen fel glicerinzselt a megnedvesített üregbe. A glicerin jobb nedvesítést biztosít a fog és a DuoTEMP között, és egyszerűbbé teszi az eltávolított az ideiglenes tömésből. Az adhézió szintén glicerinzselt használata esetén is csökken.
Vegyen fel a tömbről előadagolt DuoTEMP anyagot spatulával vagy egy megfelelő eszközzel, vigye fel, és kenje az üregbe. Kondenzorral tömörítse a DuoTEMP anyagot az üregbe, majd óvatosan tömörítse az üreg falára.

A felesleges anyag eltávolítása

A felesleges anyagot el kell távolítani a polimerizáció előtt spatula vagy egy megfelelő eszköz segítségével.

Polimerizálás

⚠ A DuoTEMP szabszorpció révén (pl. nyálhatás) 2 órán belül polimerizálódik. Az ideiglenes tömést azonnal ki lehet tenni rágási nyomásnak, ha a felület polimerizálódott. Javasolt polimerizációs készülék (pl. Coltolux LED) használatával megfelelő időtartam (max. 40 mp ≥800 mW/cm² fényteljesítmény).
Ha lehetséges, védje a tömbön lévő előadagolt DuoTEMP anyagot fényátnemeresztő fedéllel (nem kék színű).

Kezelés

Távolítsa el az okklúzális érintkezési pontokat deputáratorral.
A fényvel polimerizált ideiglenes tömés felületét óvatosan finíroztató megfelelő rotációs eszközök segítségével.

A DuoTEMP ideiglenes tömések és ideiglenes endodontikus lezárások eltávolítása az üregből

Fúró vagy deputáror használatával a DuoTEMP kőhnyen, nagy darabokban eltávolítható az üregből. Öblítsen ki az üreget vízzel, majd óvatosan tömörítse. A további maradványok könnyen eltávolíthatók kefével.

A DuoTEMP eltávolítása inlay és onlay preparációkból

Deputátor használatával a DuoTEMP könnyen, nagy darabokban eltávolítható az üregből. Öblítsen ki az üreget vízzel, majd óvatosan tömörítse.

Ošetrenie v prípade núdze

⚠ Navíchnite vyššiehovu kavitu vodní sprchou. Odeberte předem nadávkovaný materiál DuoTEMP z podložky špachtlí nebo jiným nástrojem, naneste jej a vtlačte do kavity. Kondenzujte materiál DuoTEMP v kavitě čpátkem a jemně jej přitlačte ke stěnám kavity. Velmi hluboké kavity se doporučuje nevyplňovat úplně, aby bylo možné DuoTEMP z kavity pozdější snadno odstranit.

Volitelné

Pro snazší odstranění provizorní výplně lze nanést před aplikací materiálu DuoTEMP do kavity glycerinový gel. Tak sníží přilnavost.

Lejárati idő és tárolás

⚠ A DuoTEMP érzékeny a nedvességre.
A védőborítással ellátott fecskendőtestek vákuumcsomagolásban, lezárt (tropusálva) zárótasakokban kerülnek szállításra. A felnyitott fecskendőnek lejárati ideje rövid, ezért gyorsan fel kell használni őket.
A DuoTEMP-et tartalmazó, nyitva hagyott fecskendőkben lévő DuoTEMP anyagot szárazon, szorosan lezárva, 15 °C és 23 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak vagy más hőforrás hatásának.

Jelölés
A lejárati idő és a LOT-szám fel van tüntetve a tartályokon.

A kibocsátás dátuma

01-2019

Lietošanas instrukcija — LV

Definīcija

DuoTEMP ir divējādas sacietēšanas, rentgena staru necaurlaidīgs, balts aizpildīšanas materiāls, ko paredzēts izmantot zobu ārstniecībā pagaidu aizpildīšanas nolūkos. DuoTEMP ir cinka oksida/cinka sulfāta cements, ko paredzēts izmantot kā īslaicīgas pagaidu aizpildīšanas materiālu (paredzēts lietošanai maks. 30 dienas).

Sastāvs

Cinka oksīds
Aizpildījumi
Metakrilāta sveķi
Nātrija fluorīds

Indikācijas

- I un II klases kavitāšu pagaidu aizpildīšana
- Pagaidu hermētiska endodontija
- Pagaidu aizpildīšanas materiāls lēšķīnja un pārklājuma sagatavēm

Kontrindikācijas

Kavitāšu pagaidu aizpildīšana, ja kavitāšu izveidoš