

xantALGIN® CRONO

Instrucciones de uso ES

Material para impresión a base de alginato de frágado rápido.

Campo de aplicación: xantALGIN CRONO está indicado para todas las impresiones en las que se pueda emplear alginato de frágado rápido. Cambio de color en todos los momentos decisivos importantes.

Descripción: alginato con aroma de menta, violeta claro, exento de polvo.

Contraindicaciones: Este producto o cualquiera de sus elementos pueden, en casos aislados, causar reacciones alérgicas. En caso de duda, puede solicitar información sobre los componentes al fabricante.

Cambio de color: xantALGIN CRONO cambia de color en todos los momentos decisivos.

• Al comienzo de la mezcla: azul

• Al final del tiempo de mezcla: violeta

• Al final del tiempo de elaboración: rosa

(última posibilidad de introducir la cuchara en la boca): blanco

• Al final del tiempo de retención en la boca (el molde puede extraerse de la boca): blanco

Ayudas de extracción: cuchara para el polvo y recipiente de agua.

Modo de uso: Transpare Ud. el contenido del paquete de relleno al recipiente hermético inmediatamente después de abrirlo. Debe abrirse una sola bolsa de repuesto cada vez. Antes de usarla se da vuelta a la lata 2 o 3 veces para aflojar el polvo.

Proporción de mezcla: 22,5 g de polvo : 50 ml H₂O

Dosificación: 1 (2) (3) (4) Cuchilla dosatore Δ 6,9 g (13,8 g) (20,7 g) (27,5 g) de polvo : 15,3 ml (30,6 ml) (46,0 ml) (61,2 ml) d'agua.

Se toma el xantALGIN CRONO con la cuchara suavemente de la taza y se llena a ras. Ponga este polvo en un recipiente limpio y agregue la cantidad de agua necesaria. Para un mayor impresión completa se precisan generalmente 3 cucharas de xantALGIN CRONO con la cantidad respectiva de agua. Con una espátula se mezcla el polvo y agua a una masa homogénea. Si se usa mezcladora automática deben seguirse las instrucciones del fabricante de la misma.

Tiempo de mezclar: 40 sec.

Tiempo de trabajo: * 75 sec.

Mínimo tiempo de frágado en boca: 60 sec.

Tiempo de frágado: * 135 seg.

Tiempos con * se refieren desde el comienzo de mezcla a una temperatura de 23°C (73°F) para ambos, polvo y agua, con una dureza de agua de aprox. 13°. Las temperaturas más elevadas reducen estos tiempos y las temperaturas más bajas los alargan. Los diversos grados de dureza del agua que se utiliza también pueden provocar variaciones de estos tiempos (utilizando agua destilada, los tiempos de trabajo y los tiempos de hielo aumentan 30 segundos).

Elaboración del modelo en los cinco días siguientes al moldeo: La exactitud máxima del modelo se consigue enjuagando minuciosamente el molde inmediatamente después de extraerlo de la boca, irrigándolo inmediatamente después por ejemplo con MOLDANO®, MOLDASTONE® o MOLDASYN®.

Si se prevé un almacenamiento prolongado, el molde debe guardarse en una bolsa de plástico herméticamente cerrada (humedad relativa del 100%). Esto es esencial para obtener resultados óptimos cuando se irriga más tarde. El molde preserva su estabilidad dimensional hasta cinco días, lo que significa que el moldeo puede ser conservado durante 100 horas (en una bolsa de plástico herméticamente cerrada) sin que sufra una retracción relevante. Así, su prótesis dispone de más tiempo con menos estrés.

Desinfección: Las impresiones pueden tratarse con desinfectantes comúnmente utilizados. En este caso deben seguirse las instrucciones de desinfección y de elaboración del correspondiente fabricante.

Almacenaje del producto: xantALGIN CRONO debe mantenerse en un recipiente hermético en un lugar seco y a una temperatura máxima de 25°C (77°F).

EN ISO 21563

Revisión: 2018-11

xantALGIN® CRONO

Instruções de utilização PT

Massa de modelar de alginato, de secagem rápida.

Indicações: xantALGIN CRONO é indicado para todos os moldes de base algínica. O produto muda de cor em todos os momentos decisivos.

Descrição: Pó com base em alginato, violeta claro, desprovido de poeira, com sabor de menta.

Contraindicações: Este produto ou algum de seus componentes pode provocar reações alérgicas em casos isolados. Em caso de suspeita, contate o fabricante para obter informações sobre a composição.

Mudança de cor: xantALGIN CRONO modifica a cor em todos os momentos decisivos.

• Início da mistura: azul

• Ao final do tempo de mistura: violeta

• Ao final do tempo de preparo (última possibilidade de colocação da colher na boca): rosa

• Fim do tempo de permanência na boca (impresão pode ser retirada da boca): branco

Auxílios para a remoção: Colher com pô e recipiente para a água.

Processamento:imediatamente após a abertura do refig e conteúdo deve ser transferido para a lata hermética fechar. Abrir sempre só o refig e transferir o conteúdo. A lata deve ser agitada duas a três vezes antes do uso para soltar o pó.

Proporção da mistura: 22,5 g de pô : 50 ml H₂O

Dosagem: 1 (2) (3) (4) Colher-média Δ 6,9 g (13,8 g) (20,7 g) (27,5 g) de pô : 15,3 ml (30,6 ml) (46,0 ml) (61,2 ml) de água (recipiente deve ser preenchido até a marca inferior ou superior, respectivamente).

Retirar uma colher rasa de xantALGIN CRONO da lata, remover o excesso, colocar em um recipiente de mistura e adicionar a quantidade de água correspondente. Para um molde de gengiva contendo todos os dentes geralmente são necessárias 3 colheres de xantALGIN CRONO e a quantidade de água correspondente. Misturar o pô e a água com uma espátula até obter uma consistência homogênea. Em caso de uso de um misturador automático, observar as instruções do fabricante.

Tiempo de mistura: 40 segundos

Tiempo de processamento: * 75 segundos

Tiempo de permanência mínima bucal: 60 segundos

Tiempo total de adherencia: * 135 segundos

Os tempos indicados com * valem a partir do inicio do processamento da mistura e se referem a uma temperatura de 23°C (73°F) com dureza da água em cerca de 13 graus. Temperaturas mais elevadas encurtam, temperaturas mais baixas prolongam esses tempos. Graus variáveis de dureza da água usada para a mistura podem igualmente levar a alteração dos tempos (o uso de água destilada eleva os tempos de processamento e de adherência em 30 segundos).

Produção do modelo em 5 dias após a obtenção da impressão: A máxima perfeição do modelo se obtém pelo minucioso enxaguado da impressão imediatamente após a retirada da boca e pelo imediato preenchimento, por exemplo, com MOLDANO®, MOLDASTONE® ou MOLDASYN®.

Se um armazenamento mais longo estiver prevista, o molde deve ser guardado em um saco plástico bem fechado (umidade relativa 100%). Isso é necessário para posterior obtenção de resultados perfeitos no preenchimento. A moldagem tem uma estabilidade dimensional de até 5 dias. Isso significa que a impressão pode ficar 100 horas armazenada (em um saco plástico bem fechado) sem que ocorra encolhimento relevante. Dessa forma, seu técnico dentário terá mais tempo e incorrerá em menores estrés.

Desinfecção: Moldagens podem ser tratadas com as substâncias desinfetantes habitualmente comercializadas. Favor observar as normas para o procedimento de desinfecção do respectivo fabricante.

Condições de armazenamento: Armazenar xantALGIN CRONO em lugar seco e com temperatura máxima de 25°C (77°F).

EN ISO 21563

Última revisão: 2018-11

xantALGIN® CRONO

Istruzioni per l'uso IT

Materiale per impronte a base di alginato a presa rapida.

Campo di applicazione: Lo xantALGIN CRONO è adatto per tutte le impronte in cui si può impiegare alginato a presa rapida. Cambio di color in tutti i momenti decisivi importanti.

Caratteristiche: Alginato all'aroma di menta, violeta chiaro, privo di polvere.

Contraindicationi: Questo prodotto o i suoi componenti possono causare reazioni allergiche in determinati casi. In caso di dubbio, rivolgersi al produttore per informazioni sui componenti.

Copertura a color: xantALGIN CRONO cambia colore in tutti i momenti decisivi importanti.

• Al comienzo de la mezcla: azul

• Al final del tiempo de mezcla: violeta

• Al final del tiempo de elaboración: rosa

(última posibilidad de introducir la cuchara en la boca): blanco

• Al final del tiempo de retención en la boca (el molde puede extraerse de la boca): blanco

Ayudas de extracción: cuchara para el polvo y recipiente de agua.

Modo de uso: Transpare Ud. el contenido del paquete de relleno al recipiente hermético inmediatamente después de abrirlo. Debe abrirse una sola bolsa de repuesto cada vez. Antes de usarla se da vuelta a la lata 2 o 3 veces para aflojar el polvo.

Proportion de mezcla: 22,5 g de polvo : 50 ml H₂O

Dosificación: 1 (2) (3) (4) Cuchilla dosatore Δ 6,9 g (13,8 g) (20,7 g) (27,5 g) de polvo : 15,3 ml (30,6 ml) (46,0 ml) (61,2 ml) d'agua.

Se toma el xantALGIN CRONO con la cuchara suavemente de la taza y se llena a ras. Ponga este polvo en un recipiente limpio y agregue la cantidad de agua necesaria. Para un mayor impresión completa se precisan generalmente 3 cucharas de xantALGIN CRONO con la cantidad respectiva de agua. Con una espátula se mezcla el polvo y agua a una masa homogénea. Si se usa mezcladora automática deben seguirse las instrucciones del fabricante de la misma.

Tiempo de mezclar: 40 sec.

Tiempo de trabajo: * 75 sec.

Mínimo tiempo de frágado en boca: 60 sec.

Tiempo de frágado: * 135 sec.

Tiempos con * se refieren desde el comienzo de mezcla a una temperatura de 23°C (73°F) para ambos, polvo y agua, con una dureza de agua de aprox. 13°. Las temperaturas más elevadas reducen estos tiempos y las temperaturas más bajas los alargan. Los diversos grados de dureza del agua que se utiliza también pueden provocar variaciones de estos tiempos (utilizando agua destilada, los tiempos de trabajo y los tiempos de hielo aumentan 30 segundos).

Elaboración del modelo en los cinco días siguientes al moldeo: La exactitud máxima del modelo se consigue enjuagando minuciosamente el molde inmediatamente después de extraerlo de la boca, irrigándolo inmediatamente después por ejemplo con MOLDANO®, MOLDASTONE® o MOLDASYN®.

Si se prevé un almacenamiento prolongado, el molde debe guardarse en una bolsa de plástico herméticamente cerrada (humedad relativa del 100%). Esto es esencial para obtener resultados óptimos cuando se irriga más tarde. El molde preserva su estabilidad dimensional hasta cinco días, lo que significa que el moldeo puede ser conservado durante 100 horas (en una bolsa de plástico herméticamente cerrada) sin que sufra una retracción relevante. Así, su prótesis dispone de más tiempo con menos estrés.

Desinfección: Las impresiones pueden tratarse con desinfectantes comúnmente utilizados. En este caso deben seguirse las instrucciones de desinfección y de elaboración del correspondiente fabricante.

Almacenaje del producto: xantALGIN CRONO debe mantenerse en un recipiente hermético en un lugar seco y a una temperatura máxima de 25°C (77°F).

EN ISO 21563

Revisión: 2018-11

xantALGIN® CRONO

Istrucciones de uso ES

Gebrauchsanweisung DE

Οδηγίες Χρήσης GR

Návod k použití CZ

Használati utasítás HU

Lietošanas instrukcija LV

Naudojimo instrukcija LT

Instruções de utilização PT

Gebruiksaanwijzing NL

Bruksanvisning SE

Brugervejledning DK

Bruksanvisning NO

Käyttöohjeet FI

Campi di applicazione: Lo xantALGIN CRONO è adatto per tutte le impronte in cui si può impiegare alginato a presa rapida.

Caratteristiche: Alginato all'aroma di menta, violetta chiaro, privo di polvere.

Contraindicationi: Questo prodotto o i suoi componenti possono causare reazioni allergiche in determinati casi. In caso di dubbio, rivolgersi al produttore per informazioni sui componenti.

Copertura a color: xantALGIN CRONO cambia colore in tutti i momenti decisivi importanti.

• Al comienzo de la mezcla: azul

• Al final del tiempo de mezcla: violeta

• Al final del tiempo de elaboración: rosa

(última posibilidad de introducir la cuchara en la boca): blanco

• Al final del tiempo de retención en la boca (el molde puede extraerse de la boca): blanco

Ayudas de extracción: cuchara para el polvo y recipiente de agua.

Modo de uso: Transpare Ud. el contenido del paquete de relleno al recipiente hermético inmediatamente después de abrirlo. Debe abrirse una sola bolsa de repuesto cada vez. Antes de usarla se da vuelta a la lata 2 o 3 veces para aflojar el polvo.

Proportion de mezcla: 22,5 g de polvo : 50 ml H₂O

Dosificación: 1 (2) (3) (4) Cuchilla dosatore Δ 6,9 g (13,8 g) (20,7 g) (27,5 g) de polvo : 15,3 ml (30,6 ml) (46,0 ml) (61,2 ml) d'agua.

Se toma el xantALGIN CRONO con la cuchara suavemente de la taza y se llena a ras. Ponga este polvo en un recipiente limpio y agregue la cantidad de agua necesaria. Para un mayor impresión completa se precisan generalmente 3 cucharas de xantALGIN CRONO con la cantidad respectiva de agua. Con una espátula se mezcla el polvo y agua a una masa homogénea. Si se usa mezcladora automática deben seguirse las instrucciones del fabricante de la misma.

Tiempo de mezclar: 40 sec.

Tiempo de trabajo: * 75 sec.

Mínimo tiempo de frágado en boca: 60 sec.

Tiempo de frágado: * 135 sec.

Tiempos con * se refieren desde el comienzo de mezcla a una temperatura de 23°C (73°F) para ambos, polvo y agua, con una dureza de agua de aprox. 13°. Las temperaturas más elevadas reducen estos tiempos y las temperaturas más bajas los alargan. Los diversos grados de dureza del agua que se utiliza también pueden provocar variaciones de estos tiempos (utilizando agua destilada, los tiempos de trabajo y los tiempos de hielo aumentan 30 segundos).

xantALGIN® CRONO

Οδηγίες χρήσης

Αλγινικό αποτυπωτικό υλικό ταξιδίου πίρης.

Ενέδειξη: Το xantALGIN CRONO είναι αλγινικό τελεταιάς γενιάς, το οποίο αλλάζει χρώμα σε όλες τις κρίσιμες φάσεις κατά τη διάρκεια της αποτυπωτικής του πορείας. Το xantALGIN CRONO είναι κατάλληλο για όλες τις τεχνικές λήψης αποτυπωτικών που την περιπτώσει αποτύπωση με αλγινικό.

Περιγραφή προϊόντος: Αλγινικό που δεν δημιουργεί σκόνη κατά την μετατροπή και μέτρια, σε χρώμα ανοιχτό βιολέτι, με άριθμο μέτρα.

Αντιστρεβείς: Αυτό το προϊόν ή είναι από τα συντακτικά της μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να προκαλέσουν αλλεργικές αντιτροπές. Σε περιπτώσεις υποψίας, πληροφορείς σχετικά με τα συντακτικά είναι διανοτάτα να ληφθούν από τον κατασκευαστή.

Χρησιμική Αλιγινί: Το xantALGIN CRONO αλλάζει χρώμα σε όλα τις κρίσιμες φάσεις κατά τη διάρκεια λήψης του αποτυπωτικού με αλγινικό.

• Αργή ανάμυξη: μπλε
• Τέλος ανάμυξης: βιολέτι
• Τέλος του χρώματος πήχης (της αποτύπωσης που θα φέρεται από το στόμα): ποκ
• Τέλος του χρώματος πήχης (της αποτύπωσης πουθενά): λευκό

Βοηθόματα: Είναι για τη σκόνη και δουσιευτικού δερμάτινου νερού.

Διαδικασία: Αφού ανοίξετε τη συσκευασία μεταφέρετε το υλικό σε ένα δοχείο που να κλείνει αεροστεγιώς. Ανοίξετε μόνο μια συσκευασία κάθε φορά. Ανακινήστε τη συσκευασία δύο ή τρεις φορές πριν τη χρήση, για να απομακρυνθεί τη σκόνη.

Αναλογικά ανάμυξης: 22,5 g ποκ: 50 ml νερού.

Μέτρηση: 1 (2) (3) (4) Κουπάτι Δ 6,9 g (13,8 g) (20,7 g) (27,5 g) αράβη : 15,3 ml (30,6 ml) (46,0 ml) (61,2 ml) νερό.

Αφαρέστε από το δοχείο την κατάλληλη ποσότητα xantALGIN CRONO, με τη χρήση του κουπαλιού. Τοποθετήστε τη σκόνη σε μια ανάμυξη και προσθέτετε την αντίστοιχη ποσότητα νερού. Οι κουπάτες xantALGIN CRONO και το πολύτιμο νερό, που θα σηματούσεται συνήθειας για μεγάλητερη αποτύπωση. Αναβάψτε την σκόνη και το νερό με μια στρέγη ανάμυξης, ώστε στις οδηγίες του κατασκευαστή.

Χρόνος ανάμυξης: 40 δευτερόλεπτα

Χρόνος σραγίδας: * 75 δευτερόλεπτα

Ελάχιστος χρόνος πήχης στο στόμα: 60 δευτερόλεπτα

Χρόνος πήχης: 135 δευτερόλεπτα

Οι ροή που μεταφέρεται από την αρχή της ανάμυξης σε βερμοκρασία τη σκόνη και το νερό, με ακρίβεια περισσότερο περίπου 13 βαθμών. Οι ροή που αποτελείται από την αποτύπωση του νερού μπορούν επίσης να επερέουν στη παρατίνη χρόνους που επιλέγεται από την αρχή της αποτυπωτικής πορείας. Η μέγιστη ακρίβεια του εκμεταλλεύματος που προσέχεται είναι την αποτύπωση του αποτύπωσης που αποτελείται από την λήψη του αποτυπωτικού υλικού.

Κατασκευή μέρους από 5 μέρες από τη λήψη του αποτυπωτικού: Η μέγιστη ακρίβεια του εκμεταλλεύματος που προσέχεται είναι την αποτύπωση του αποτυπωτικού υλικού που προσέχεται από την λήψη του αποτυπωτικού υλικού.

Αν χρησιμεύεται πρόσωπος χρόνος φύλαξης, το αποτύπωση μπορεί να διατηρηθεί σε μια καλή κλεψυδρή πλαστική σακούλα, (σημειώνεται 100%). Αυτό είναι απαραίτητο για τέλεια αποτελέσματα στο πλευρό του εκμεταλλεύματος.

Anwendung: Το αποτυπωτικό που απολύμανται με τις αντίστοιχες προκαταρκέσεις για την αποτύπωση και την επεξεργασία.

Φύλαξη του προϊόντος: Το xantALGIN CRONO φυλάσσεται σε αεροστεγές δοχείο σε έρημη απρόσφατη και σε μέγιστη βερμοκρασία 25°C (77°F).

EN ISO 21563

Ημερομηνία τελεταιάς αναθεώρησης: 2018-11

DE Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche basiert auf bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte, und befiehlt Sie nicht von der eigenen Prüfung der uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

GB Our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. It does not release you from the obligation to test the products supplied by us as and to their suitability for the intended processes and uses. The application, use and processing of the products are beyond our control, and therefore, entirely your own responsibility. Should, in spite of this, liability be established for any damage, it will be limited to the value of the goods delivered by us and used by you. We will, of course, provide consistent quality of our products within the scope of our General Conditions of Sale and Delivery.

FR Les conseils que nous vous donnons verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique et de nos essais n'engagent pas notre responsabilité – même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle – et ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier par des essais pratiques si nos produits conviennent aux procédures et applications que vous envisagez. L'utilisation, la mise en œuvre et la transformation des produits fournis échappent à notre contrôle et relèvent, dès lors, exclusivement de votre responsabilité. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison.

ES Nuestra asesoría de aplicaciones técnicas en base a palabras, escritos y mediante ensayos se lleva a cabo conforme a nuestro leal saber, sin embargo, sólo es válida a manera de recomendación sin ningún compromiso, incluso con respecto a eventuales derechos de protección de terceros, y no lo compromesa a usted de comprobar la idoneidad de los productos suministrados por nosotros para los procesos y fines pretendidos. Aplicación, uso y manipulación de los productos están más allá de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, responsabilidad exclusiva del usuario. Naturalmente, garantizamos la impecable calidad de nuestros productos de acuerdo a nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

IT La nostra consulenza in merito alle tecniche di applicazione sia verbale che scritta e sperimentale si basa sullo stato della scienza, tuttavia vale solo come indicazione non vincolante, anche in riferimento ad eventuali diritti di terzi e non vi esonerà dall'effettuare prove in proprio dei prodotti da noi forniti onde appurare l'idoneità all'uso ed ai processi previsti. L'applicazione, l'uso e la lavorazione dei prodotti avviene al di là delle nostre possibilità di controllo e rientra pertanto solo ed esclusivamente nella vostra responsabilità. Garantiamo una qualità ineccepibile dei nostri prodotti in conformità alle nostre Condizioni generali di vendita e di fornitura.

Alginikum

xantALGIN® CRONO

Οδηγίες χρήσης

Návod k použití

Rychle spájající alginátová formovač masa pro otisky.

Oblasti nasazení: xantALGIN CRONO se hodí k výrobě všech otisků, ve kterých se používají algináty. Mění barvu při všech rozhodujících momentech.

Popis: světle flávový průšek, který nepráší, na alginátové bázi s větrovou přichutí.

Kontrolník: Tento výrobek neboli některá z jeho složek můžou vyvolat alergickou reakci. V případě podezření na alergickou reakci lze informaci o složení získat přímo od výrobcu.

Změna barev: xantALGIN CRONO mění barvu při všech rozhodujících momentech.

• začít michání: modrý
• konec michání: flávový
• Konec přípravy doby (poslední možnost vložit číslo do úst): růžový
• Konec doby uložení v ústech (tiskové se může vynadat z úst): bílá

Pracovní pomůcky: těžky pro prásek a vodní nádoba.

Zpracování: xantALGIN CRONO mění barvu při všech rozhodujících momentech.

• A keveris megkezelésének: kék
• A keveris időjeletével: ibolya
• A keveris időjeletével: purpursarkans
• A szájban maradási idő lejtéjközben (a nyomatmassza kihelye a szájból): sárga
• Szájelmesítés: fehér

Felhasználási segítségi eszközök: kanál a púder és vizes edény.

Feldolgozás: Atároltű csomag tartalmát felbontás után azonnal atíltítsa a hermetikus, visszazárató dobozba. Mindenkor csak egy utároltű csomagot bont fel és töltön át. A púder fellazításához a doboz minden használálat előtt 2-3 rázr melegítse meg.

Keverési arány: 22,5 g puder : 50 ml H₂O

xantALGIN CRONO vydává zářku z jízky a zbytek prášku v jímce zavrzavá. Mindejednou lehce atíltítsa a vodní edényt ho do jímky. Jímku před použitím 2-3 krát otvírá, aby se prášek zklíny.

Dávkování: 1 (2) (3) (4) Lízce Δ 6,9 g (13,8 g) (20,7 g) (27,5 g) prášku : 15,3 ml (30,6 ml) (46,0 ml) (61,2 ml) vody.

Δávkování: 1 (2) (3) (4) Lízce Δ 6,9 g (13,8 g) (20,7 g) (27,5 g) prášku : 50 ml H₂O

xantALGIN CRONO vydává zářku z jízky a zbytek prášku v jímce zavrzavá. Mindejednou lehce atíltítsa a vodní edényt ho do jímky. Jímku před použitím 2-3 krát otvírá, aby se prášek zklíny.

Pomer smíchaní: 22,5 g puder : 50 ml H₂O

Adagolás: 1 (2) (3) (4) Lízce Δ 6,9 g (13,8 g) (20,7 g) (27,5 g) puder : 15,3 ml (30,6 ml) (46,0 ml) (61,2 ml) vize.

xantALGIN CRONO vydává zářku z jízky a zbytek prášku v jímce zavrzavá. Mindejednou lehce atíltítsa a vodní edényt ho do jímky. Jímku před použitím 2-3 krát otvírá, aby se prášek zklíny.

Dobová skutečnost: 1 (2) (3) (4) Lízce Δ 6,9 g (13,8 g) (20,7 g) (27,5 g) prášku : 50 ml H₂O

xantALGIN CRONO vydává zářku z jízky a zbytek prášku v jímce zavrzavá. Mindejednou lehce atíltítsa a vodní edényt ho do jímky. Jímku před použitím 2-3 krát otvírá, aby se prášek zklíny.

Dobová skutečnost: 1 (2) (3) (4) Lízce Δ 6,9 g (13,8 g) (20,7 g) (27,5 g) prášku : 50 ml H₂O

xantALGIN CRONO vydává zářku z jízky a zbytek prášku v jímce zavrzavá. Mindejednou lehce atíltítsa a vodní edényt ho do jímky. Jímku před použitím 2-3 krát otvírá, aby se prášek zklíny.

Dobová skutečnost: 1 (2) (3) (4) Lízce Δ 6,9 g (13,8 g) (20,7 g) (27,5 g) prášku : 50 ml H₂O

xantALGIN CRONO vydává zářku z jízky a zbytek prášku v jímce zavrzavá. Mindejednou lehce atíltítsa a vodní edényt ho do jímky. Jímku před použitím 2-3 krát otvírá, aby se prášek zklíny.

Dobová skutečnost: 1 (2) (3) (4) Lízce Δ 6,9 g (13,8 g) (20,7 g) (27,5 g) prášku : 50 ml H₂O

xantALGIN CRONO vydává zářku z jízky a zbytek prášku v jímce zavrzavá. Mindejednou lehce atíltítsa a vodní edényt ho do jímky. Jímku před použitím 2-3 krát otvírá, aby se prášek zklíny.

Dobová skutečnost: 1 (2) (3) (4) Lízce Δ 6,9 g (13,8 g) (20,7 g) (27,5 g) prášku : 50 ml H₂O

xantALGIN CRONO vydává zářku z jízky a zbytek prášku v jímce zavrzavá. Mindejednou lehce atíltítsa a vodní edényt ho do jímky. Jímku před použitím 2-3 krát otvírá, aby se prášek zklíny.

Dobová skutečnost: 1 (2) (3) (4) Lízce Δ 6,9 g (13,8 g) (20,7 g) (27,5 g) prášku : 50 ml H₂O

xantALGIN CRONO vydává zářku z jízky a zbytek prášku v jímce zavrzavá. Mindejednou lehce atíltítsa a vodní edényt ho do jímky. Jímku před použitím 2-3 krát otvírá,